

Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart

- Der Wiesen-Bocksbart gehört in die Familie der Korbblütler (Asteraceae). Er kommt in Europa und Vorderasien vor. Im gesamten Gebiet ist er auf nährstoffreichen Böden wie Wiesen und an Wegrändern anzutreffen.
- Der Wiesen-Bocksbart kann 30 - 80 cm hoch werden mit einem Kopfdurchmesser bis 4,5 cm. Die Blüten sind hellgelb, so lang wie die Hüllblätter oder etwas kürzer und bis in den frühen Nachmittag geöffnet. Die Blütezeit reicht von Mai bis Juli.
- Die Art hat besonders kunstvoll und effektiv konstruierte Flugfrüchte mit Fallschirmchen. Diese verfügen über eine nahezu geschlossene Tragfläche, die dadurch entsteht, dass die Strahlen des radförmigen Haarkranzes durch Fiederhärchen miteinander verbunden sind. Es lohnt sich, dieses Muster einmal näher mit der Lupe zu betrachten. Die gefiederten Härchen auf jeder Frucht sollen an einen Ziegenbart erinnern und Anlass für den Namen sein.
- In der Naturheilkunde werden die Blätter, der Saft und die frisch gesammelten Wurzeln verwendet.

Quellen:

- Buch: "Der neue Kosmos Pflanzenführer" aus der Serie KosmosNaturführer
- infoflora.ch
- [Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesen-Bocksbart)